

Dr: Gustavo Mascotti.

348.8400274

Medico Chirurgo. Spec. in Ostetricia e Ginecologia. Oncologia Ginecologica e Senologia
Milano. Tel: 02.70601599. gus.mascotti@tiscali.it

NOTA INFORMATIVA PER LAPAROTOMIA

La laparotomia, viene eseguita compiendo un'incisione addominale più o meno ampia, longitudinale o trasversale, che permette la diretta visualizzazione degli organi addomino-pelvici.

Le complicanze più frequenti possono essere:

- presenza nell'immediato post-operatorio di un dolore alla regione addominale
- lesioni vascolari: di solito vengono interessati piccoli vasi degli strati superficiali della parete addominale, il cui danno determina la comparsa di un ematoma che si risolve in genere spontaneamente nel giro di una settimana. Nei casi più importanti può essere necessario un drenaggio chirurgico dell'ematoma.
- lesioni intestinali: queste possono essere riconosciute durante l'intervento e risolte in poche minuti, se invece dovessero essere diagnosticate successivamente le complicanze saranno direttamente proporzionali all'entità della lesione. Se la lesione è importante potrà essere necessario un successivo reintervento laparoscopico o laparotomico a giudizio dei chirurghi.
- infezioni: è un evento raro ed in genere di lieve entità, nella maggior parte dei casi è limitata alle incisioni cutanee. Solo raramente si tratta di infezioni pelviche.
- complicanze tromboemboliche, in genere prevenute dalla mobilizzazione precoce, dal bendaggio degli arti, dalla somministrazione di farmaci anticoagulanti dal giorno prima

Tutte le complicanze citate variano di frequenza a secondo degli studi riportati in Letteratura e sono strettamente correlate alla difficoltà dell'intervento ed alla gravità della patologia presente. Molte di queste complicanze si risolvono spontaneamente e rapidamente, alcune però possono impiegare tempi più lunghi e, raramente, comportare un'invalidità permanente.

Dopo l'intervento la paziente sarà trattenuta in ospedale 2 -3 o più giorni a discrezione del chirurgo e delle condizioni del post-operatorio.

La regolare ripresa fisica avverrà entro 15 - 20 giorni circa dall'intervento